№ п/п	возраст	диагноз	24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
1	69 лет	(Гипотрофия) ЗНО молочной железы. Синдром белкового дефицита и мальадсорбции. Грибковое поражение стоп. Полисерозит. 6 курсов химиотерапии.	2,47	0,85	0,51	3,45	0,66	0,39	1,8	0,89	0,54

1. После курса пребиотиков по клиническим жалобам уменьшилось вздутие кишечника. Однако вес тела остается на уровне гипотрофии. По данным лабораторного обследования на первой точке замера повышен уровень ацетона. После недельного курса уровень ацетона стал выше, чем при начале обследования), после второй недели приема препарата уровень ацетона пришел в норму.

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
2	50 лет	Хронический гастрит, метаболический синдром.	1,42	0,89	0,71	1,24	0,81	0,59	нет замера	нет замера	нет замера

2. Клинически снизился аппетит, опорожнение кишечника регулярное. При исследовании выявлено лабораторно на момент первого обследования повышенное количество изопрена, после первого курса показатели пришли к норме.

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
3	53 года	Метаболический синдром, гиперхолестеринемия, желчекаменная болезнь, ожирение 3. Миома матки. Патологический климакс.	1,84	1,09	1,44	1,31	0,5	0,94	1,06	0,7	1,03

3. В результате обследования выявлен высокий уровень уксусных составляющих и изопрена.
После проведенного курса уксусные компоненты пришли к норме, но изопрен остался на повышенном уровне (в промежуточном исследовании он был ниже, чем на выходе из эксперимента).
Клинически отметила снижение аппетита, уменьшение объема живота. Исчезла полностью изжога.
Рекомендовано продолжить данный курс препарата для более длительной терапии

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
4	56 лет	Ожирение 2 . Метаболический синдром. Стеатоз печени. Гиперхолестеринемия.	1,86	0,97	0,77	1,27	0,68	0,45	1,58	0,78	0,57

4. После первой недели приема препарата обращала внимание на снижение аппетита и уменьшение вздутия. По данным лабораторного обследования- на первой неделе и далее уровень изопрена пришел в норму.

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
5	53 года	Патологический климакс. Болезнь раздраженного кишечника, дискинезия желчевыводящих путей, дисбактериоз кишечника.	2,03	1,03	0,48	1,56	0,81	0,42	1,27	0,81	0,56

5. По данным исследования обнаружен повышенный уровень уксусных составляющих. После первой недели приема препарата данные нормализовались и сохранялись до конца эксперимента.
Однако! Пациентка отрицает положительную клиническую динамику (все жалобы сохраняются) Встает вопрос об психогенной зависимости жалоб со стороны кишечника.

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
6	63 года	Метаболический синдром.Стеатоз печени.Гиперхолестеринемия. Нестабильная артериальная гипертензия. Ожирение 1 ст.	2,45	0,84	1,3	1,57	0,53	0,58	1,41	0,72	0,84

6. После двух курсов пребиотика уровень изопрена остается выше нормы (думаю, что в данном случае следует увеличить кратность обследования на метаболические показатели (пациент угрожаем по развитию сахарного диабета и артериальной гипертензии)

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
7	63 года	Недостаточность кардии, дискинезия желчевыводящих путей. Дисбактериоз. Множественные липомы.	2,69	1,02	0,85	1,7	0,44	0,22	1,58	0,78	0,57

7. По данным лабораторных исследований на момент первого обследования наблюдались сдвиги во всех трех составляющих). После 1-го курса пребиотика и на протяжении всего эксперимента нормальные цифры установились в конце первой недели и сохранялись в норме
Клинически: вздутие и горечь во рту уменьшились. Обращает внимание на снижение аппетита по вечерам.

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
8	51 год	Метаболич. Синдром, дискинезия жвп, аутоиммунный тиреоидит. Ожирение-2 ст.	1,1	0,78	0,34	1,03	0,57	0,34	0,96	0,74	0,35

8. Клинически аллергические явления со стороны слизистых сохраняются, хотя и уменьшились . Стул нормализовался, вздутие уменьшилось.
По данным лабораторного исследования - патологии не выявлено.

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
9	49 лет	Хронический гастрит. Невроастения. Нейроциркуляторная дистония. Дискинезия желчевыводящих путей. Недостаточность кардии. Дисбактериоз кишечника.Миома	1,51	0,95	0,4	1,25	0,5	0,24	нет замера	нет замера	нет замера

9. После первого курса пребиотика нормальные значения лабораторных данных. Исходный уровень так же в норме.
Обилие жалоб пациентки заставляют думать о психогенном характере многих жалоб.

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
10	56 лет	Недостаточность кардии. Метаболич. синдром, атеросклероз сосудов нижних конечностей.	1,24	0,78	нет замера	1,11	0,61	0,23	1,43	0,85	0,52

10. Со стороны лабораторных данных патологии не выявлено, но клинически уменьшилось вздутие и изжога.

			24.05.16			31.05.16			07.06.16		
			ацетон	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**	**ацетон**	**уксус**	**изопрен**
11	67 лет	Витилиго. Астенизация центральной нервной системы	1,67	0,97	0,49	0,91	0,45	0,28	0,4	0,2	0,28

11. Исходные цифры в пределах нормы, но после принятия коктейлей цифры приобрели показатели ниже нормы (ацетон и уксус), что интерпретировать можно как ослабленное состояние иммунитета. (возможно перенесенное ОРВИ)